



## Newsletter - Juin 2016

**« Equi-pâture » : valoriser l'herbe dans l'alimentation du cheval et pratiquer une vermifugation raisonnée**

### Actualité du programme Equi-pâture

La récolte des fourrages (notamment de l'enrubanné) est en cours dans les exploitations pilotes malgré une météo peu favorable aux mois de mai et juin.

Au printemps, 156 coprosopies individuelles sur chevaux adultes ont été réalisées dans les 12 exploitations. Seuls les chevaux fortement infestés (strongles et/ou ténias) ont été vermifugés avec la molécule adaptée. Les notes d'état corporel des 162 chevaux suivis ont également été relevés.

**Retrouvez dans cette lettre des fiches techniques, le témoignage de Thomas de Cornière (Elevage des Parts) sur la récolte et le choix des fourrages pour ses animaux ainsi que la mise en œuvre des pratiques raisonnées de vermifugation dans les exploitations du Limousin. (au dos)**

**ifce**  
institut français  
du **cheval**  
et de l'**équitation**



  
**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRES D'AGRICULTURE

  
RÉGION  
NORMANDIE

  
l'Europe  
**s'engage**  
en  
Basse-Normandie  
avec le FEADER

  
Fédération Nationale  
des Conseils des Chevaux  
et/ou des Équidés de France

### Conduite des pâtures

#### ● Réussir la récolte des fourrages

Un « bon » fourrage se définit par sa qualité sanitaire (poussière, allergènes) et par sa valeur alimentaire. Retrouvez ici les bonnes pratiques de récolte pour produire un fourrage sain et adapté aux besoins des animaux. [En savoir plus](#)

#### ● La renoncule ou bouton d'or : adventice des prairies

Le bouton d'or est une plante indésirable envahissant les prairies. Elle est toxique lorsque la plante est consommée fraîche. Des pratiques culturales adaptées permettent de lutter ou limiter la propagation de cette mauvaise herbe. [En savoir plus](#)

### Conduite des chevaux

#### ● Comment interpréter la note d'état corporel

La note d'état corporel consiste à estimer l'importance des dépôts adipeux sous-cutanés du cheval sur une échelle de 0 à 5. A partir d'observations manuelles (palpers) et visuelles, la note attribuée est comparée à l'optimum (entre 2,5 et 3,5) afin d'ajuster au mieux les apports alimentaires. [En savoir plus](#)

#### ● Les parasites digestifs des équidés

Au pâturage, les chevaux se contaminent de façon constante avec des parasites. Cette fiche propose de détailler le cycle de vie des principaux parasites digestifs du cheval. [En savoir plus](#)


**Dans la prochaine newsletter** : le compostage, le rumex : adventice à combattre, la surveillance des chevaux au pâturage, la résistance aux parasites.

Le programme **Equi-pâture** 2016-2017 s'appuie sur le suivi de 12 exploitations dans 3 régions. Ces structures volontaires dites « pilotes » ont été choisies afin d'illustrer la diversité des activités agricoles équinés et des spécificités régionales. Voici des interviews d'exploitants sur la récolte et le choix des fourrages pour leurs chevaux ainsi que les pratiques de vermifugation :



### Elevage des Parts (T. de Cornière)

élevage chevaux de sport  
& bovins allaitants.



**« Vermifugation raisonnée : en Limousin seul un cheval sur 2 a nécessité une vermifugation de printemps. »**

Dans toutes les exploitations pilotes, la vermifugation systématique de printemps a été supprimée : des coproscopies ont été réalisées au mois de mai sur tous les chevaux suivis.

Sur les 4 exploitations de la région Limousin, les coproscopies ont porté sur 35 chevaux et d'après leurs résultats, seuls 18 ont eu besoin d'être vermifugés.

Les relevés d'état corporel ont par ailleurs mis en évidence que certains chevaux fortement infestés présentaient pourtant un niveau d'état « gras » : le degré d'infestation n'est pas forcément lié à une note d'état corporel basse.



### Interview de Thomas de Cornière sur la récolte et le choix des fourrages pour ses animaux:

**Comment sont gérées les récoltes en foin et enrubannage sur votre exploitation ?**

« Les surfaces de foin et d'enrubannages varient tous les ans car la météo impacte fortement les récoltes. Les parcelles en prairie temporaire sont uniquement enrubannées car ces prairies ont un taux de trèfle important qui risque d'être perdu (par fanage) si je réalise du foin. La 2<sup>nd</sup>e coupe sur les prairies naturelles est très souvent réalisée en enrubannage car il est difficile de faire sécher du foin en septembre. Mais rien n'est figé, si le mois de septembre permet une coupe de foin, je le fais. »

**A qui sont distribués ces différents fourrages ?**

« Je fonctionne en 2 lots pour les enrubannages et les foins. Pour les enrubannages, j'ai un lot d'enrubannés plutôt sec (70% de MS) qui est globalement destinés aux chevaux et un lot plus humide qui est destiné aux bovins. Mais je m'adapte en fonction des disponibilités. En ce moment, je distribue le même enrubannage aux chevaux et aux bovins (environ 60% de MS) et cela ne pose pas de problème. Pour les foins, je fonctionne aussi en 2 lots entre les bons foins et ceux de qualité moyenne. En début de saison, je mélange les 2 types de foin pour tout le monde. A partir du milieu de saison, je réserve le bon foin aux chevaux au travail et de concours. Les autres chevaux ont du foin moyen et de l'enrubannage de prairie et de méteil (mélange de pois et d'avoine) à volonté. Cet enrubannage contenant du méteil est riche en énergie ce qui compense le foin de moins bonne qualité. Les poulains ont de l'enrubannage mais pas à volonté. Les jeunes de 2 ans ont uniquement du foin à volonté. »

**Pourquoi réserver l'enrubannage le plus sec aux chevaux ?**

« J'ai remarqué que l'enrubanné trop humide était difficile à digérer pour les chevaux provenant d'une plus forte fermentation des fourrages humides. De plus, l'enrubannage sec est plus facile à distribuer aux animaux car les bottes sont moins lourdes. Pour faciliter la différenciation, je stocke les enrubannages et les foins dans 2 lieux différents. »